

平成24年9月

医療関係者各位

販売元 杏林製薬株式会社  
発売元 キョーリンメディオ株式会社  
製造販売元 東洋カプセル株式会社

E P A 製 剤  
エパキ ャ ッ プ ソ フ ト カ プ セ ル 300mg  
(イコサペント酸エチル軟カプセル剤)

「用法・用量」追加のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「エパキ ャ ッ プ ソ フ ト カ プ セ ル 300mg」(有効成分：イコサペント酸エチル)につきまして、平成24年9月7日付で高脂血症における用法・用量が追加になりました。それに伴い、用法・用量を変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

・【用法・用量】( 部：追加箇所、 部：削除箇所)

改 訂 後	改 訂 前
<p>・高脂血症 イコサペント酸エチルとして、通常、成人 1 回 900mg(3 カプセル)を 1 日 2 回又は 1 回 600mg(2 カプセル) を 1 日 3 回、食直後に経口投与する。 ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1 回 900mg(3 カプセル)、1 日 3 回まで増量できる。</p>	<p>・高脂血症 イコサペント酸エチルとして、通常、成人 1 回 600mg(2 カプセル) を 1 日 3 回、<del>毎</del>食直後に経口投与する。 ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1 回 900mg(3 カプセル)、1 日 3 回まで増量できる。</p>

以上