

平成24年9月

医療関係者各位

ニッポファーマ株式会社
東洋カプセル株式会社

EPA製剤

イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」

—イコサペント酸エチル・軟カプセル剤—

「用法・用量」追加のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「TC」」、「イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」」、「イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」」（有効成分：イコサペント酸エチル）につきまして、平成24年9月7日付で高脂血症における用法・用量が追加になりました。それに伴い、用法・用量を変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

・【用法・用量】（ 部：追加箇所、部：削除箇所）

改訂後	改訂前
<p>・高脂血症</p> <p>イコサペント酸エチルとして、通常、成人 <u>1回900mgを1日2回</u>又は1回600mgを1日3回、食直後に経口投与する。</p> <p>ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg、1日3回まで増量できる。</p>	<p>・高脂血症</p> <p>イコサペント酸エチルとして、通常、成人 1回600mgを1日3回、毎食直後に経口投与する。</p> <p>ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg、1日3回まで増量できる。</p>

以上